

<i>V Gallinae</i>	I Cracidae 2... 1. Penelopinac 2. Cracinae
	II Megapodiidae 2...
	III Phasianidae 5.. 1. Pavoninae 2. Phasianinae 3. Gallinae
	IV Tetraonidae 5.. 1. Pedicinae 2. Turnicinae
	V Chionididae 2...
	VI Tinamidae 1...
<i>II Struthiones</i>	I Struthionidae 3...
<i>III Grallae</i>	I Charadriidae 6.. 2. Cursorinae
	II Ardeidae 5..
	III Scopacidae 6..
	IV Pelomedidae 2... 1. Parrinae
	V Rallidae 2...
<i>VIII Anseres</i>	I Anatidae 8.. 3. Anserinae 4. Cygninae, 5. Anatinac
	II Colymbidae 3...
	III Alcidae 4...
	IV Procellariidae 2...
	V Laridae 3..
	VI Pelecanidae 3..

13.) Sammlung aus europäischer Schmetterlinge. Dr. Herrich-Schäffer. Regensburg 1850-58.

Gründet sein System der Schmetterlinge hauptsächlich auf die Flügelrippen, zieht aber auch die Form der Fühler u. s. v. in Betracht. Die sehr gelungenen Zeichnungen sind von C. Geyer.

Rhopalocera. Morphina. Pavonia Uranus oder Caligo uranus. Der grosse Blauschwarze. Unterflügel mit gelben Streifen. Spitze der Oberflügel hat 4 weiße Flecken. Caligo aesculus ist klein. Blauschwarz.

Nymphalina, hat das Genus Catagramma. (No 21 vielleicht die neuen?) ✕

Lycaenina. Thecla mega. ♂ die kleinen blauen Segen. Untere Seite weißlich. Ich gebe jetzt nur noch Specie. Keine Familie oder Ordnung mehr. Spatula pavonia Itr. Sind die Brauen mit einem weissen Streifen quer über beide Flügel. Saturnia wahlbergie Westw. oder Euphranor dione Westw. den gelben Nachdruck. v. S. Cristata sehr ähnlich.

Fortsetzung: C. Geyer.

14.) Beiträge zur Sammlung erotischer Schmetterlinge. J. Kiebner. Augsburg 1878-25. #832

Migonitis Stoebe. Schwarz u. gelb gestreift. ✕ Adelpha Pleasure.

Ereides Etna. Schwarz u. gelb. ♂ Ajantis Lappho (Papilio nymphalis, nreis caerulea) schwarz und weiss ✕ neunt meine aus Yanalon. Callicore Chrymena

15.) Sammlung ex. Schm. Kiebner. Augst. 1866. 2ter Band.

Dorane (Cramer) schwarz rot. gelb. Anosia Megalippa (sind Mechanites Encrate ähnlich dem? Tunias Phyllis) schwarz rot. gelb. Zethusis Ramo ähnlich den Narceps de Babb. Europa. die gelb-schwarzen vom Pie de la cuesta.) Lionia Moneta (sind die gelbbrauen mit Rossmutterflecken auf Unterflügel Rückseite.) Ageronia Tomax ii. st. Februar sind die Olivenfarbenen welche grausack machen in Fuge. u. A. Chlo. Marpesia Thetis. (bis brauner Segen, Rückseite grau-braun) Marpesia Terynthia (sind die schwarzen Segen von der Estancia. Rückseite hellweiss; hellbraun) Morpho Chalciope und M. Strophimade sind die schwarzen mit blauem Streifen, welche laut schlagen Caligo Trixie. Gelblich und Schwarz. Ende der Unterflügel bläulich. Leonte Neiliaena ♂ gross. blau. Schwarzer Rand / Leonte Nestira. gross. fast ganz blau.

Leonte Anaxibia gross. ganz blau. Leonte Eupistrophus die grossen weisen. H. G. Butler nennt sie in "Lepidoptera erotica" 1869-74: Morpho Luna, the largest of the white species of the genus Morpho. (Mexico.) = Morpho Polyphemus Boisduval in Sulzley. Gen. of Lepid.

